

Avortement médicamenteux
(A domicile ou hospitalisation)

Avortement chirurgical
(Sous anesthésie locale ou générale)

Très efficace (plus de 95% de succès)

Très efficace (plus de 99% de succès)

Très bien supporté (63% à 96% des femmes
choisiraient à nouveau cette option)

Très bien supporté (90% à 100% des femmes
choisiraient à nouveau cette option)

Sans incidence sur la fertilité : une nouvelle grossesse est possible dans les jours suivants

Peut être fait très tôt dans la grossesse et jusqu'à
9 SA

Se fait à partir de 5 SA et jusqu'à 14 SA (sous
anesthésie locale) ou 16 SA (sous anesthésie
générale)

Avoir un avortement complet peut parfois prendre
quelques jours

Avortement complet rapide (le jour même)

Saignements et douleurs parfois plus importantes
que lors des règles

Saignements légers et douleur variable

Permet la présence d'un accompagnant pendant
l'hospitalisation

Permet la présence d'un accompagnant pendant
l'hospitalisation sauf dans la salle où l'IVG a lieu

Peut être prescrit à l'hôpital ou en cabinet libéral

En général fait à l'hôpital ou dans des centres de
santé sexuelle

Intervention confidentielle

Intervention prise en charge à 100% par la Sécurité Sociale